

**Exercice 1** *Particules fermioniques*

1. Les fonctions  $\chi(\sigma_1, \sigma_2)$  dépendent de deux variables  $(\sigma_1, \sigma_2)$  appartenant à l'ensemble  $\{(1/2, 1/2), (1/2, -1/2), (-1/2, 1/2), (-1/2, -1/2)\}$ . Elles sont donc complètement caractérisées par les quatre nombres complexes  $\chi(1/2, 1/2)$ ,  $\chi(1/2, -1/2)$ ,  $\chi(-1/2, 1/2)$ , et  $\chi(-1/2, -1/2)$ . La dimension de l'espace des fonctions  $\chi$  est donc 4.
2. (a)  $P$  et  $S^z$  commutent puisque

$$\begin{aligned} P S^z \chi(\sigma_1, \sigma_2) &= (\sigma_1 + \sigma_2) P \chi(\sigma_1, \sigma_2) = (\sigma_1 + \sigma_2) \chi(\sigma_2, \sigma_1) = (\sigma_2 + \sigma_1) \chi(\sigma_2, \sigma_1) \\ &= S^z \chi(\sigma_2, \sigma_1) = S^z P \chi(\sigma_1, \sigma_2) \end{aligned}$$

et par conséquent, on peut les diagonaliser dans une base commune.

- (b) L'action de  $S_z$  est telle que

$$S_z \chi_{\sigma'_1, \sigma'_2}(\sigma_1, \sigma_2) = S_z \eta_{\sigma'_1}(\sigma_1) \eta_{\sigma'_2}(\sigma_2) = (\sigma'_1 + \sigma'_2) \eta_{\sigma'_1}(\sigma_1) \eta_{\sigma'_2}(\sigma_2).$$

Les quatre fonctions  $\eta_{\sigma'_1}(\sigma_1) \eta_{\sigma'_2}(\sigma_2)$  sont bien des fonctions propres de  $S^z$  puisque

$$\begin{aligned} S^z \eta_{1/2}(\sigma_1) \eta_{1/2}(\sigma_2) &= \eta_{1/2}(\sigma_1) \eta_{1/2}(\sigma_2) \\ S^z \eta_{-1/2}(\sigma_1) \eta_{-1/2}(\sigma_2) &= -\eta_{-1/2}(\sigma_1) \eta_{-1/2}(\sigma_2) \\ S^z \eta_{1/2}(\sigma_1) \eta_{-1/2}(\sigma_2) &= 0 \\ S^z \eta_{-1/2}(\sigma_1) \eta_{1/2}(\sigma_2) &= 0 \end{aligned}$$

- (c) Nous avons vu à la question précédente que  $\eta_{1/2}(\sigma_1) \eta_{1/2}(\sigma_2)$  et  $\eta_{-1/2}(\sigma_1) \eta_{-1/2}(\sigma_2)$  sont fonctions propres de  $S^z$  avec valeurs propres respectives 1 et  $-1$ . Il est trivial de voir que si l'opérateur de permutation  $P$  donne

$$P \chi_{\sigma'_1, \sigma'_2}(\sigma_1, \sigma_2) = P \eta_{\sigma'_1}(\sigma_1) \eta_{\sigma'_2}(\sigma_2) = \eta_{\sigma'_2}(\sigma_2) \eta_{\sigma'_1}(\sigma_1),$$

alors  $\eta_{1/2}(\sigma_1) \eta_{1/2}(\sigma_2)$  et  $\eta_{-1/2}(\sigma_1) \eta_{-1/2}(\sigma_2)$  sont aussi des fonctions propres de  $P$  avec valeurs propres 1.

Les fonctions  $\eta_{1/2}(\sigma_1) \eta_{-1/2}(\sigma_2)$  et  $\eta_{-1/2}(\sigma_1) \eta_{1/2}(\sigma_2)$  par contre sont bien des fonctions propres de  $S^z$  avec la même valeur propre 0, mais pas de  $P$ . Il faut former des combinaisons linéaires antisymétrique et symétrique (par rapport à l'échange  $\sigma_1 \leftrightarrow \sigma_2$ ) de ces fonctions pour obtenir des fonctions propres de  $P$  avec valeurs propres respectives  $-1$  (singulet) et  $+1$  (triplet).

En résumé si  $\chi_{p, s^z}$  représente la fonction propre simultanée de  $P$  et de  $S^z$  avec

valeurs propres respectives  $p$  et  $s^z$ , on a

$$\begin{aligned}\chi_{-,0}(\sigma_1, \sigma_2) &= \frac{1}{\sqrt{2}} [\eta_{1/2}(\sigma_1)\eta_{-1/2}(\sigma_2) - \eta_{-1/2}(\sigma_1)\eta_{1/2}(\sigma_2)] \\ \chi_{+,1}(\sigma_1, \sigma_2) &= \eta_{1/2}(\sigma_1)\eta_{1/2}(\sigma_2) \\ \chi_{+,0}(\sigma_1, \sigma_2) &= \frac{1}{\sqrt{2}} [\eta_{1/2}(\sigma_1)\eta_{-1/2}(\sigma_2) + \eta_{-1/2}(\sigma_1)\eta_{1/2}(\sigma_2)] \\ \chi_{+,-1}(\sigma_1, \sigma_2) &= \eta_{-1/2}(\sigma_1)\eta_{-1/2}(\sigma_2),\end{aligned}$$

où  $\chi_{-,0}$  est la combinaison antisymétrique de  $\eta_{1/2}(\sigma_1)\eta_{-1/2}(\sigma_2)$  et  $\eta_{-1/2}(\sigma_1)\eta_{1/2}(\sigma_2)$  et  $\chi_{+,0}$  celle symétrique qui fait donc partie du triplet.

3. On revient maintenant au problème de deux électrons dans un potentiel harmonique. Le principe de Pauli impose que les fonctions d'ondes de fermions soient antisymétriques. Il suit du produit  $\psi(x_1, x_2, \sigma_1, \sigma_2) = \varphi(x_1, x_2)\chi(\sigma_1, \sigma_2)$  que si  $\chi(\sigma_1, \sigma_2)$  est antisymétrique alors  $\varphi(x_1, x_2)$  doit être symétrique. Inversément, si  $\chi(\sigma_1, \sigma_2)$  est symétrique alors  $\varphi(x_1, x_2)$  doit être antisymétrique.

**Le plus bas niveau d'énergie** est celui avec les deux électrons dans le niveau  $E_0$ , c'est-à-dire avec  $\varphi(x_1, x_2) = \varphi_0(x_1)\varphi_0(x_2)$ , qui est symétrique.  $\chi(\sigma_1, \sigma_2)$  doit donc être antisymétrique, donc le seul choix qui s'offre à nous est  $\chi(\sigma_1, \sigma_2) = \chi_{-,0}(\sigma_1, \sigma_2)$ . Ainsi, la dégénérescence est 1, l'énergie propre est

$$E_{\text{état fond.}} = E_0 + E_0 = \hbar\omega$$

et la fonction propre

$$\psi_{\text{état fond.}}(x_1, x_2, \sigma_1, \sigma_2) = \varphi_0(x_1)\varphi_0(x_2)\chi_{-,0}(\sigma_1, \sigma_2)$$

**Le premier niveau excité** correspond à l'état avec un électron dans le niveau  $E_0$  et n'importe quel spin, et l'autre électron dans le niveau  $E_1$  et n'importe quel spin aussi, ce qui donne une dégénérescence de  $2 \cdot 2 = 4$ . L'énergie propre est

$$E_{1\text{er état exc.}} = E_0 + E_1 = 2\hbar\omega$$

Les 4 fonctions propres sont les suivantes: on peut construire une partie spatiale antisymétrique (1 possibilité) avec un spineur symétrique (3 possibilités)

$$\begin{aligned}\psi_{1\text{er état exc.}}^{(1)}(x_1, x_2, \sigma_1, \sigma_2) &= \frac{1}{\sqrt{2}} [\varphi_0(x_1)\varphi_1(x_2) - \varphi_1(x_1)\varphi_0(x_2)] \chi_{+,1}(\sigma_1, \sigma_2) \\ \psi_{1\text{er état exc.}}^{(2)}(x_1, x_2, \sigma_1, \sigma_2) &= \frac{1}{\sqrt{2}} [\varphi_0(x_1)\varphi_1(x_2) - \varphi_1(x_1)\varphi_0(x_2)] \chi_{+,0}(\sigma_1, \sigma_2) \\ \psi_{1\text{er état exc.}}^{(3)}(x_1, x_2, \sigma_1, \sigma_2) &= \frac{1}{\sqrt{2}} [\varphi_0(x_1)\varphi_1(x_2) - \varphi_1(x_1)\varphi_0(x_2)] \chi_{+,-1}(\sigma_1, \sigma_2)\end{aligned}$$

ou une partie spatiale symétrique (1 possibilité) avec un spineur antisymétrique (1 possibilité)

$$\psi_{1\text{er état exc.}}^{(4)}(x_1, x_2, \sigma_1, \sigma_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\varphi_0(x_1)\varphi_1(x_2) + \varphi_1(x_1)\varphi_0(x_2)] \chi_{-,0}(\sigma_1, \sigma_2)$$

**Le deuxième niveau excité** peut correspondre à l'état avec un électron dans le niveau  $E_0$  et n'importe quel spin, et l'autre électron dans le niveau  $E_2$  et n'importe

quel spin aussi (4 possibilités); ou alors à l'état avec les deux électrons dans le même niveau  $E_1$ , mais alors avec un spin différent (1 possibilité). Dans chacun de ces cas, l'énergie propre est la même

$$E_{2\text{ème état exc.}} = E_0 + E_2 = E_1 + E_1 = 3\hbar\omega$$

et la dégénérescence est donc de  $4+1 = 5$ . Les 5 fonctions propres sont les suivantes: si les électrons sont dans les niveaux  $E_0$  et  $E_2$ , on peut construire une partie spatiale antisymétrique (1 possibilité) avec un spineur symétrique (3 possibilités)

$$\begin{aligned}\psi_{2\text{ème état exc.}}^{(1)}(x_1, x_2, \sigma_1, \sigma_2) &= \frac{1}{\sqrt{2}} [\varphi_0(x_1)\varphi_2(x_2) - \varphi_2(x_1)\varphi_0(x_2)] \chi_{+,1}(\sigma_1, \sigma_2) \\ \psi_{2\text{ème état exc.}}^{(2)}(x_1, x_2, \sigma_1, \sigma_2) &= \frac{1}{\sqrt{2}} [\varphi_0(x_1)\varphi_2(x_2) - \varphi_2(x_1)\varphi_0(x_2)] \chi_{+,0}(\sigma_1, \sigma_2) \\ \psi_{2\text{ème état exc.}}^{(3)}(x_1, x_2, \sigma_1, \sigma_2) &= \frac{1}{\sqrt{2}} [\varphi_0(x_1)\varphi_2(x_2) - \varphi_2(x_1)\varphi_0(x_2)] \chi_{+,-1}(\sigma_1, \sigma_2)\end{aligned}$$

ou une partie spatiale symétrique (1 possibilité) avec un spineur antisymétrique (1 possibilité)

$$\psi_{2\text{ème état exc.}}^{(4)}(x_1, x_2, \sigma_1, \sigma_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\varphi_0(x_1)\varphi_2(x_2) + \varphi_2(x_1)\varphi_0(x_2)] \chi_{-,0}(\sigma_1, \sigma_2)$$

Et si les deux électrons sont dans le même niveau  $E_1$ , on a

$$\psi_{2\text{ème état exc.}}^{(5)}(x_1, x_2, \sigma_1, \sigma_2) = \varphi_1(x_1)\varphi_1(x_2)\chi_{-,0}(\sigma_1, \sigma_2)$$

avec une fonction spatiale symétrique et un spineur antisymétrique.

## Exercice 2 *Particules bosoniques*

On suppose dans cette partie que les particules sont des bosons sans spin. La fonction d'onde du système consiste donc uniquement en une partie spatiale, qui doit être symétrique. Pour un système de deux bosons, la dégénérescence d'un niveau d'énergie  $E$  ici est donnée par la cardinalité de l'ensemble

$$\{(m, n) \in \mathbb{N}^2 | m \leq n \text{ et } E_m + E_n = E\} \quad (1)$$

et pour un système de trois bosons, elle est donnée par la cardinalité de l'ensemble

$$\{(m, n, p) \in \mathbb{N}^3 | m \leq n \leq p \text{ et } E_m + E_n + E_p = E\}$$

1. **Le plus bas niveau d'énergie** est celui avec les deux bosons dans le niveau  $E_0$ . Ainsi, la dégénérescence est 1, l'énergie propre est

$$E_{\text{état fond.}} = E_0 + E_0 = \hbar\omega$$

et la fonction propre symétrique

$$\psi_{\text{état fond.}}(x_1, x_2) = \varphi_0(x_1)\varphi_0(x_2)$$

**Le premier niveau excité** correspond à l'état avec un boson dans le niveau  $E_0$ , et l'autre boson dans le niveau  $E_1$ . L'énergie propre est

$$E_{1\text{er état exc.}} = E_0 + E_1 = 2\hbar\omega$$

et la dégénérescence est toujours 1. La fonction propre symétrique est

$$\psi_{1\text{er état exc.}}(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\varphi_0(x_1)\varphi_1(x_2) + \varphi_1(x_1)\varphi_0(x_2)]$$

**Le deuxième niveau excité** correspond soit à l'état avec un boson dans le niveau  $E_0$ , et l'autre boson dans le niveau  $E_2$ , soit à l'état avec les deux bosons dans le même niveau  $E_1$ . On est dans le cas où la cardinalité de l'ensemble Eq. (??) – et donc la dégénérescence – est de 2. L'énergie propre est

$$E_{2\text{ème état exc.}} = E_0 + E_2 = E_1 + E_1 = 3\hbar\omega$$

et la fonction propre symétrique dans le cas des bosons dans les deux niveaux d'énergie différents

$$\psi_{2\text{ème état exc.}}^{(1)}(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\varphi_0(x_1)\varphi_2(x_2) + \varphi_2(x_1)\varphi_0(x_2)]$$

et dans le cas des bosons dans le même niveau

$$\psi_{2\text{ème état exc.}}^{(2)}(x_1, x_2) = \varphi_1(x_1)\varphi_1(x_2)$$

2. On s'intéresse maintenant au cas de trois bosons. **Le plus bas niveau d'énergie** est celui avec les trois bosons dans le niveau  $E_0$ . Ainsi, la dégénérescence est 1, l'énergie propre est

$$E_{\text{état fond.}} = E_0 + E_0 + E_0 = \frac{3}{2}\hbar\omega$$

et la fonction propre symétrique

$$\psi_{\text{état fond.}}(x_1, x_2, x_3) = \varphi_0(x_1)\varphi_0(x_2)\varphi_0(x_3)$$

**Le premier niveau excité** correspond à l'état avec deux bosons dans le niveau  $E_0$ , et le troisième boson dans le niveau  $E_1$ . L'énergie propre est

$$E_{1\text{er état exc.}} = E_0 + E_0 + E_1 = \frac{5}{2}\hbar\omega$$

et la dégénérescence est toujours 1. La fonction propre symétrique est

$$\psi_{1\text{er état exc.}}(x_1, x_2, x_3) = \frac{1}{\sqrt{3}} [\varphi_0(x_1)\varphi_0(x_2)\varphi_1(x_3) + \varphi_0(x_1)\varphi_1(x_2)\varphi_0(x_3) + \varphi_1(x_1)\varphi_0(x_2)\varphi_0(x_3)]$$